Resultaat samenvatting

Dientamoeba fragilis

Dientamoeba fragilis is een eencellige darmparasiet die vooral in de dikke darm wordt aangetroffen. Veel mensen hebben geen klachten, waardoor het aantonen van de parasiet niet automatisch bewijst dat Dientamoeba de oorzaak van darmproblemen is. Bij een deel van de mensen wordt de parasiet in verband gebracht met diarree, buikpijn, een opgeblazen gevoel, misselijkheid en vermoeidheid. De precieze overdrachtsroute is nog niet volledig opgehelderd. In dit rapport lees je hoe je de uitslag in de context van je klachten beoordeelt en wanneer behandeling of verder onderzoek zinvol kan zijn.



Blastocystis Hominis

Blastocystis is een eencellig micro-organisme dat wereldwijd zeer vaak in de darm wordt aangetroffen. De oudere naam Blastocystis hominis wordt nog veel gebruikt, maar vanwege de grote genetische variatie wordt tegenwoordig meestal gesproken over Blastocystis sp. Veel dragers hebben geen klachten en de ziekmakende betekenis is niet in iedere situatie duidelijk. Het aantonen van Blastocystis laat dus zien dat het aanwezig is, maar bewijst niet automatisch dat Blastocystis de oorzaak is van buikpijn, diarree of een opgeblazen gevoel. In dit rapport lees je hoe je de uitslag zorgvuldig interpreteert.




Giardia lamblia

Giardia lamblia, ook Giardia duodenalis genoemd, is een ziekteverwekkende darmparasiet die giardiasis kan veroorzaken. De parasiet hecht zich aan de dunne darm en kan waterige of vettige diarree, winderigheid, buikkrampen, misselijkheid, uitdroging en gewichtsverlies geven. Klachten beginnen vaak één tot twee weken na besmetting en kunnen zonder behandeling weken aanhouden of terugkeren. Het aantonen van Giardia vraagt om gerichte medische beoordeling. In dit rapport lees je hoe besmetting ontstaat en welke herstel- en hygiënemaatregelen belangrijk zijn.



Cryptosporidium spp.

Cryptosporidium is een groep eencellige darmparasieten die cryptosporidiose kan veroorzaken. De infectie staat vooral bekend om waterige diarree en verspreidt zich gemakkelijk via met ontlasting besmet water, voedsel, handen, oppervlakken en dieren. Klachten beginnen meestal twee tot tien dagen na besmetting, gemiddeld na ongeveer zeven dagen. Bij mensen met een gezonde afweer gaat de infectie vaak binnen één tot twee weken over, maar bij een sterk verminderde afweer kan het ziektebeeld ernstiger en langduriger zijn. In dit rapport lees je wat jouw uitslag betekent en welke maatregelen verdere verspreiding helpen beperken.



Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica is een ziekteverwekkende amoebe die amebiasis kan veroorzaken. Veel besmette mensen hebben aanvankelijk geen klachten, maar de parasiet kan de darmwand binnendringen en ontsteking, slijm of bloed bij de ontlasting geven. In zeldzamere gevallen verspreidt de infectie zich naar de lever en ontstaat een leverabces. Het aantonen van Entamoeba histolytica vraagt daarom altijd om medische beoordeling, ook als klachten mild zijn. In dit rapport lees je hoe besmetting ontstaat, hoe vaak symptomen voorkomen en wanneer snelle zorg nodig is.



Cyclospora cayetanensis

Cyclospora cayetanensis is een eencellige darmparasiet die cyclosporiasis kan veroorzaken. De infectie wordt vooral in verband gebracht met besmet water en verse producten zoals kruiden, groenten en fruit. Klachten beginnen meestal ongeveer één week na besmetting en bestaan vooral uit langdurige waterige diarree, vermoeidheid, buikklachten en gewichtsverlies. Zonder behandeling kunnen de klachten langer dan een maand aanhouden of tijdelijk verdwijnen en terugkeren. In dit rapport lees je hoe de parasiet wordt overgedragen en waarom directe overdracht tussen mensen minder waarschijnlijk is.

