

Naam
Sample

Voorbeeld
123456789



Onderzoek Glutenintolerantie

Dit antilichaam wordt aangemaakt als reactie op gluten en speelt een rol bij het opsporen van coeliakie (glutenintolerantie). Bij deze auto-immuunziekte veroorzaakt gluten een ontstekingsreactie in de darmen, wat kan leiden tot beschadiging van het darmslijmvlies en spijsverteringsklachten. Een verhoogde waarde van Anti-ht-Transglutaminase wijst op een immuunreactie tegen gluten. Hoge waarden vormen geen direct bewijs van coeliakie, maar signaleren een verhoogde kans op deze ziekte. Verder onderzoek is nodig voor de diagnose. Voor een completere interpretatie is het belangrijk ook naar de andere sIgA's te kijken, een antilichaam dat de darmgezondheid weerspiegelt.



UW RESULTAAT

Het resultaat van uw onderzoek is 65 mU/g.

Uw resultaat toont een Anti-ht-Transglutaminase concentratie van minder dan 100 mU/g, wat binnen de normale waarden valt. Dit betekent dat er geen verhoogde immuunreactie tegen gluten is waargenomen. Normale waarden sluiten coeliakie of glutenovergevoeligheid grotendeels uit, tenzij u al (deels) glutenvrij eet. Andere spijsverteringsklachten kunnen nog steeds aanwezig zijn.

Resultaat: 65 mU/g.



225,00
180,00
135,00
90,00
45,00

