




Resultaten



Ancylostoma spp. – Mijworm ●



Ascaris spp. – Spoelworm ●



Encephalitozoon intestinalis ●



Enterobius vermicularis – Aarsmade ●



Enterocytozoon bieneusi ●



Hymenolepis spp. – Dwerglintworm ●



Necator americanus – Mijworm ●

Resultaat samenvatting

Ancylostoma spp. – Mijworm


Ancylostoma behoort tot de mijwormen. Deze parasitaire wormen kunnen via besmette grond het lichaam binnendringen en zich uiteindelijk in de dunne darm vestigen. Daar hechten volwassen wormen zich aan de darmwand en voeden zich met bloed. Een lichte infectie kan ongemerkt verlopen, terwijl een grotere of langdurige infectie kan bijdragen aan buikklachten, bloedverlies en uiteindelijk ijzergebrek of bloedarmoede.

[Lees meer](#)



Ascaris spp. – Spoelworm

Ascaris is een spoelworm die in de menselijke dunne darm kan leven. Besmetting ontstaat door het inslikken van eitjes uit grond, voedsel of water dat met menselijke ontlasting is verontreinigd. Veel infecties geven weinig klachten. Bij een grotere wormbelasting kunnen buikklachten ontstaan en in zeldzame gevallen kunnen grote aantallen





Encephalitozoon intestinalis



Enterobius vermicularis –
Aarsmade



Enterocytozoon bieneusi



Hymenolepis spp. –
Dwerglintworm



Necator americanus –
Mijnworm



Strongyloides spp.



Taenia spp. – Lintworm



Trichuris trichiura –
Zweepworm



Informatie

wormen zich aan de darmwand en voeden zich met bloed. Eenichte infectie kan ongemerkt verlopen, terwijl een grotere of langdurige infectie kan bijdragen aan buikklachten, bloedverlies en uiteindelijk ijzergebrek of bloedarmoede.

[Lees meer](#)



Negatief



Positief

Ascaris spp. – Spoelworm

Ascaris is een spoelworm die in de menselijke dunne darm kan leven. Besmetting ontstaat door het inslikken van eitjes uit grond, voedsel of water dat met menselijke ontlasting is verontreinigd. Veel infecties geven weinig klachten. Bij een grotere wormbelasting kunnen buikklachten ontstaan en in zeldzame gevallen kunnen grote aantallen wormen de darm blokkeren.

[Lees meer](#)



Encephalitozoon intestinalis

Encephalitozoon intestinalis is eveneens geen worm maar een microsporidium. Het organisme kan cellen van de dunne darm



Resultaten



Ancylostoma spp. – Mijworm ●



Ascaris spp. – Spoelworm ●



Encephalitozoon intestinalis ●



Enterobius vermicularis –
Aarsmade ●



Enterocytozoon bieneusi ●



Hymenolepis spp. –
Dwerglintworm ●



Necator americanus –
Mijworm ●

← Terug naar Resultaten

Ancylostoma spp. – Mijworm

Ancylostoma behoort tot de mijwormen. Deze parasitaire wormen kunnen via besmette grond het lichaam binnendringen en zich uiteindelijk in de dunne darm vestigen. Daar hechten volwassen wormen zich aan de darmwand en voeden zich met bloed. Een lichte infectie kan ongemerkt verlopen, terwijl een grotere of langdurige infectie kan bijdragen aan buikklachten, bloedverlies en uiteindelijk ijzergebrek of bloedarmoede.

Resultaat
0.01

Hoe kun je besmet raken?

Een besmetting met *Ancylostoma* ontstaat meestal door contact met grond of zand waarin besmettelijke larven aanwezig zijn. De larven kunnen actief door de huid dringen, bijvoorbeeld via blote voeten, handen of andere onbedekte huid. De bodem kan besmet raken wanneer ontlasting van een besmet mens, hond of kat erin terechtkomt. Sommige soorten *Ancylostoma* kunnen ook via de mond worden opgenomen.

Mijnwormen van honden en katten kunnen bij mensen in de huid terechtkomen. De larven kunnen zich vervolgens door de huid verplaatsen en een sterk jeukende, kronkelende huidafwijking veroorzaken, cutane larva migrans genoemd.

Komt dit vaak voor in Nederland?

Nee. Een menselijke mijnworminfectie wordt in Nederland niet vaak opgelopen. Mijnwormen komen vooral voor in warme, tropische en subtropische gebieden. Nederlandse patiënten met een mijnworminfectie hebben deze daarom meestal tijdens verblijf in het buitenland opgelopen.

Hoe kun je besmetting voorkomen?

Draag schoenen wanneer je in warme landen over aarde of zand loopt. Vermijd direct huidcontact met mogelijk verontreinigde grond en gebruik bijvoorbeeld een handdoek of mat op het strand. Draag handschoenen bij tuinieren in risicogebieden, was je handen na contact met aarde en verwijder ontlasting van honden en katten zorgvuldig. Was groente en fruit goed voor consumptie.

Ancylostoma spp.,

na contact met aarde en verwijder ontlasting van honden en katten zorgvuldig. Was groente en fruit goed voor consumptie.



Leefstijl

Voorkom nieuwe blootstelling

Leefstijl

Voorkom nieuwe blootstelling

- Draag schoenen in gebieden waar mijnworm voorkomt.
- Vermijd direct huidcontact met mogelijk besmette grond.
- Was handen na werken met aarde.
- Was groenten en fruit zorgvuldig.
- Zorg tijdens reizen voor goede sanitaire omstandigheden.



Supplementen

IJzer

Waarom dit relevant kan zijn

Resultaten



Ancylostoma spp. – Mijworm ●



Ascaris spp. – Spoelworm ●



Encephalitozoon intestinalis ●



Enterobius vermicularis –
Aarsmade ●



Enterocytozoon bieneusi ●



Hymenolepis spp. –
Dwerglintworm ●



Necator americanus –
Mijworm ●

← Terug naar Resultaten

Ascaris spp. – Spoelworm

Ascaris is een spoelworm die in de menselijke dunne darm kan leven. Besmetting ontstaat door het inslikken van eitjes uit grond, voedsel of water dat met menselijke ontlasting is verontreinigd. Veel infecties geven weinig klachten. Bij een grotere wormbelasting kunnen buikklachten ontstaan en in zeldzame gevallen kunnen grote aantallen wormen de darm blokkeren.

Resultaat

2



Hymenolepis spp. –
Dwerglintworm



Necator americanus –
Mijnworm



Strongyloides spp.



Taenia spp. – Lintworm



Trichuris trichiura –
Zweepworm



Informatie


Download samenvatting



Vragen over je uitslag?

Chat met onze slimme

AI-Health Coach



Het resultaat van uw onderzoek is 2.

In jouw ontlastingsmonster is genetisch materiaal van *Ascaris* spp. aangetoond. Dit past bij aanwezigheid van een spoelworminfectie.

Na het inslikken komen larven uit de eitjes vrij. Deze doorlopen een bijzondere route door het lichaam en passeren onder andere de longen voordat ze uiteindelijk terugkeren naar de dunne darm. Daar groeien ze uit tot volwassen wormen. Hierdoor kunnen in verschillende fasen verschillende klachten optreden. Wat moet je nu doen? Neem contact op met je huisarts. Ascariasis kan met antiparasitaire medicatie worden behandeld en behandeling is doorgaans kort. Wanneer sneller medische hulp zoeken? Neem

Hoe kun je besmet raken?

Een spoelworminfectie ontstaat door het inslikken van microscopisch kleine wormeitjes. Deze eitjes komen via ontlasting in de bodem terecht en worden daar na verloop van tijd besmettelijk. Besmetting kan plaatsvinden via ongewassen groente en fruit, besmet water, aarde aan de handen of door met verontreinigde handen de mond aan te raken.

Naast de menselijke spoelworm kunnen ook spoelwormen van varkens mensen infecteren.

Komt dit vaak voor in Nederland?

Spoelworminfecties komen in Nederland voor, maar veel minder vaak dan aarsmaden. Besmetting kan onder andere voorkomen in gebieden met varkenshouderijen, omdat spoelwormen veel bij varkens voorkomen. Wereldwijd komt de menselijke spoelworm vooral voor in gebieden met onvoldoende sanitaire voorzieningen.

Hoe kun je besmetting voorkomen?

Was je handen zorgvuldig na toiletgebruik, tuinieren en contact met aarde, en altijd voordat je gaat eten of voedsel bereidt. Was groente en fruit goed en gebruik tijdens reizen betrouwbaar drinkwater. Voorkom dat kinderen aarde in hun mond stoppen en let extra op hygiëne bij contact met grond rondom varkenshouderijen.

Ascaris spp., spoelworm

1 Hoe loop je het op?

Ascaris spp., spoelworm

1 Hoe loop je het op?



2 Zo ziet het eruit



Leefstijltips

Voedselhygiëne

- Was groenten en fruit zorgvuldig.

Leefstijltips

Voedselhygiëne

- Was groenten en fruit zorgvuldig.
- Schil of kook producten wanneer hygiëne onzeker is.
- Was handen na contact met aarde.
- Drink tijdens reizen alleen veilig water.
- Was handen vóór het eten.



Supplementen

Er is geen supplement dat Ascaris betrouwbaar behandelt.

Bij langdurige diarree of verminderde voedingstoestand kunnen voedingsstoffen eventueel worden aangevuld wanneer daadwerkelijk tekorten aanwezig zijn.